

정오표

| 문제집 | 페이지 | 번호 | 수정항목 | 수정답안 | 수정내용 |
|-----|--------|------|------|------|--|
| 1권 | 27페이지 | 51번 | 오답수정 | 4번 | 정답 : ③ → ④ |
| | 46페이지 | 106번 | 오답수정 | 2번 | 정답 : ④ → ② |
| | 66페이지 | 9번 | 보기수정 | 3번 | 제1대구치 |
| | 107페이지 | 7번 | 오답수정 | 4번 | 정답 : ⑤ → ④ |
| | 131페이지 | 79번 | 보기수정 | 1번 | 법랑층 |
| | 147페이지 | 127번 | 오답수정 | 1번 | 정답 : ② → ① |
| | 148페이지 | 129번 | 보기수정 | 5번 | 사상유두 |
| | 157페이지 | 21번 | 보기수정 | 1번 | 호중구와 단핵구의 침윤이 많아진다. |
| | | | | 2번 | 림프구, 형질세포, 대식세포가 많아진다. |
| | 162페이지 | 34번 | 보기수정 | 4번 | 구강점막 특히 혀, 구순, 혀에서 반복적으로 나타난다. |
| | 163페이지 | 38번 | 보기수정 | 5번 | 지도설은 설배부에 원형 또는 타원형의 흥반이~. |
| | 181페이지 | 88번 | 보기수정 | 5번 | 골화석증 |
| | 230페이지 | 77번 | 보기수정 | 1번 | 타액선의 분비가 늘어난다. |
| | 237페이지 | 98번 | 보기수정 | 2번 | 압각-자율신경말단 |
| | 262페이지 | 61번 | 문제수정 | | 연쇄상구균이 체내에 침입되면 발생하는 질환은? |
| | 295페이지 | 51번 | 보기수정 | 4번 | 개인의 참여와 노력으로만 이루어진다. |
| | 309페이지 | 90번 | 문제수정 | | 대규모 정수장의 수돗물 불소농도 조정사업에 사용되는 불소는? |
| | 312페이지 | 99번 | 문제수정 | | 1981년 진해시 수돗물 불소농도조정사업에 사용되었던 불소는? (현재 우리나라 시행하고있지x) |
| | | | 보기수정 | 3번 | 불화나트륨 |
| | 335페이지 | 52번 | 보기수정 | 2번 | 무형 비인적 자본 |

정오표

| 문제집 | 페이지 | 번호 | 수정항목 | 수정답안 | 수정내용 |
|-----|--------|------|------|------|---|
| 1권 | 358페이지 | 43번 | 문제수정 | | ~ 6개월 경우 기능 상실 치율로 옳은 것은? |
| | 358페이지 | 44번 | 문제수정 | | 평균 현존 치아 수 에 대한 설명으로 옳은 것은? |
| | 387페이지 | 23번 | 보기수정 | 2번 | 가-욕구, 나-동기 |
| | 387페이지 | 24번 | 보기수정 | 3번 | 상을 반복해서 주면 외향성 아동은 성격이 점차 진보적으로 형성된다. |
| | 389페이지 | 29번 | 문제수정 | | 매슬로우(Maslow) 가 주장한 욕구 단계~ |
| 2권 | 11페이지 | 3번 | 오답수정 | 1번 | 정답 : ④ → ① |
| | 15페이지 | 15번 | 보기수정 | 2번 | 병적인 상태일 경우에만 치료하도록 한다. |
| | 30페이지 | 60번 | 보기수정 | 4번 | 타액의 성분 중 아밀레이스 는 우식증을 감소시킨다. |
| | 32페이지 | 65번 | 보기수정 | 3번 | Vitamin C |
| | 37페이지 | 79번 | 보기수정 | 3번 | 올바른 잇솔질 |
| | 41페이지 | 92번 | 문제수정 | | 치아우식증의 설탕관련 입증 효과 중 극단통제효과와 관련이 있는 것은? |
| | 42페이지 | 94번 | 보기수정 | 5번 | 4단 치아우식병 예방법에는 치면세균막 관리, 불소도포, 치면열구전색, 식이조절이 있다. |
| | 47페이지 | 109번 | 오답수정 | 1번 | 정답 : ⑤ → ① |
| | | | 보기수정 | 1번 | 치아에 백색반점 이나 심한 경우 외형이 흐트러진 흑색반점 이 나타난다. |
| | 48페이지 | 112번 | 문제수정 | | 치주병의 역학적 특성으로 옳은 것은? |
| | 48페이지 | 114번 | 문제수정 | | 부정교합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |
| | 48페이지 | 114번 | 오답수정 | 2번 | 정답 : ⑤ → ② |
| | 53페이지 | 127번 | 보기수정 | 4번 | 흑인보다 백인에서 부정교합이 더 많이 발생한다. |
| | | | 해설수정 | | 인종요인 : 백인 > 흑인 |
| | 53페이지 | 128번 | 문제수정 | | 구강병 발생요인의 숙주요인 중 구강 외 신체요인만을 나열한 것은? |

정오표

| 문제집 | 페이지 | 번호 | 수정항목 | 수정답안 | 수정내용 |
|--------|--------|------|------|------------------------------------|--|
| 2권 | 55페이지 | 135번 | 보기수정 | 1번 | 반점치는 비영구적이다. |
| | 63페이지 | 157번 | 보기수정 | 4번 | 폰즈법을 잘 하는 아동 |
| | 74페이지 | 190번 | 해설수정 | | 2열 미세모 칫솔 : 치주염 환자의 bass법 시행 시 사용 |
| | 81페이지 | 211번 | 오답수정 | 2번 | 정답 : ⑤ → ② |
| | 83페이지 | 216번 | 보기수정 | 4번 | 사용 시 매번 제조 한다. |
| | | | 보기수정 | 5번 | 성인의 경우 2%로 불화나트륨을 사용한다. |
| | | | 오답수정 | 2번 | 정답 : ① → ② |
| | 85페이지 | 223번 | 보기수정 | 1번 | 우유 를 복용시켜 불소농도를 희석시킨다. |
| | 92페이지 | 244번 | 보기수정 | 2번 | 초기 우식증이 발생되어 있는 열구에 전색할 수 없다. |
| | | | 오답수정 | 3번 | 정답 : ② → ③ |
| | 97페이지 | 260번 | 보기수정 | 1번 | 치아 점착도 |
| | 102페이지 | 275번 | 문제수정 | | 우식 감수성이 높은 사람의 경우 치면세균막의 수소이온농도와 타액의 pH농도는? |
| | 119페이지 | 6번 | 오답수정 | 3번 | 정답 : ④ → ③ |
| | 133페이지 | 46번 | 문제수정 | | 상악 부위 시술 시 환자의 자세로 가장 올바른 것은? |
| | 147페이지 | 89번 | 해설수정 | | afterfive~, 3mm 길다. (깊은 치주낭 접근 가능), minifive currette~, terminal shank는 길어지고~ |
| | 147페이지 | 90번 | 보기수정 | 5번 | mirror 사용 |
| | 175페이지 | 173번 | 보기수정 | 5번 | 변성 백악질 제거에 도움 |
| 181페이지 | 192번 | 보기수정 | 2번 | 윤활제의 역할은 숫돌의 유리화를 방지하는 것이다. | |
| 198페이지 | 32번 | 보기수정 | 5번 | X선 필름 에 대한 감광 효과가 있다. | |
| 206페이지 | 56번 | 보기수정 | 1번 | 발생된 열을 효과적으로 제거한다. | |

정오표

| 문제집 | 페이지 | 번호 | 수정항목 | 수정답안 | 수정내용 |
|--------|--------|------|------|---|---------------------------------------|
| 2권 | 209페이지 | 66번 | 보기수정 | 5번 | 환자의 안면에 닿는 X선 속의 직경은 2.75인치 이상 |
| | 218페이지 | 93번 | 보기수정 | 3번 | 할로겐화는 결정의 크기가 클수록 선예도는 높아진다. |
| | 221페이지 | 100번 | 보기수정 | 1번 | 악골 내 병변이나 이물질 등의 위치를 확인할 수 없다. |
| | | | 오답수정 | 3번 | 정답 : ① → ③ |
| | 237페이지 | 150번 | 보기수정 | 1번 | KvP 고정 |
| | | | | 4번 | 고감광도 필름 사용 |
| | 237페이지 | 150번 | 오답수정 | 4번 | 정답 : ① → ④ |
| | 244페이지 | 169번 | 오답수정 | 1번 | 정답 : ④ → ① |
| | 262페이지 | 222번 | 보기수정 | 5번 | 촬영 술식이 비교적 간단해서 환자의 불편감을 해소한다. |
| | 266페이지 | 232번 | 보기수정 | 3번 | 전체 치근단촬영법 보다 촬영시간이 길다. |
| | | | | 5번 | 전체 치근단촬영법 보다 상의 확대와 왜곡이 적다. |
| | 283페이지 | 280번 | 보기수정 | 1번 | 관전류(mA)를 감소시킨다. |
| | 290페이지 | 301번 | 오답수정 | 2번 | 정답 : ④ → ② |
| | 310페이지 | 20번 | 보기수정 | 4번 | P.F.M crown |
| | 321페이지 | 53번 | 보기수정 | 4번 | 치질과 물리적 접촉을 하지 않는다. |
| | 326페이지 | 68번 | 오답수정 | 1번 | 정답 : ② → ① |
| | 330페이지 | 78번 | 보기수정 | 5번 | 인접 치아와 관계하여 여러 개의 치아에 발생한다. |
| | 330페이지 | 78번 | 오답수정 | 4번 | 정답 : ⑤ → ④ |
| 352페이지 | 30번 | 보기수정 | 2번 | 일정 시간이 지나도록 압배사를 제거하지 않을 시 치은의 영구퇴축이 일어날 수 있다. | |
| 356페이지 | 40번 | 오답수정 | 5번 | 정답 : ② → ⑤ | |

정오표

| 문제집 | 페이지 | 번호 | 수정항목 | 수정답안 | 수정내용 |
|------|--------|-----|------|------------|---|
| 2권 | 380페이지 | 5번 | 해설수정 | | ①태아기(=무치열기) |
| | 386페이지 | 22번 | 해설수정 | | ①주기적으로 조금씩 갈아주어 3차 상아질의 형성을 유도 |
| | 387페이지 | 26번 | 보기수정 | 4번 | 짜증을 잘 내지 않는다. |
| | 389페이지 | 31번 | 보기수정 | 4번 | 2차 상아질의 형성은 영구치에서 더 활발하다. |
| | 391페이지 | 38번 | 보기수정 | 2번 | 행동조절 시 문제가 될 수 있는 불안 요소를 단계적으로 적용하여 공포를 극복한다. |
| | 395페이지 | 48번 | 문제수정 | | 연령에 따른 어린이의 행동 양상 중에서 옳은 것은? |
| | 404페이지 | 76번 | 보기수정 | 2번 | 과잉치와 매복치 |
| | | | 해설수정 | | 3) 외상에 의한 치근파절 유치 |
| | 438페이지 | 63번 | 보기수정 | 4번 | 보정장치는 치료 후 동적 교정치료에 소요된 기간과 같은 정도로 계속 사용하도록 한다. |
| | 445페이지 | 3번 | 해설수정 | | ③1:100,000 에피네프린 함유 국소마취제 3개 이상 사용 금지 |
| | 450페이지 | 16번 | 보기수정 | 4번 | bone rongeur |
| | 461페이지 | 45번 | 보기수정 | 5번 | 비출혈 시 병원에 가지 않아도 된다. |
| | 473페이지 | 80번 | 문제수정 | | 치성 감염의 치료 원칙으로 옳지 않은 것은? |
| | 475페이지 | 85번 | 보기수정 | 4번 | 치수복조술 |
| 3권 | 21페이지 | 49번 | 문제수정 | | 외부와의 전반적 협조가 어려움 |
| | 59페이지 | 27번 | 문제수정 | | 상악 제1유구치에서 치수가 넓게 노출되는 치수염증으로 옳은 것은? |
| | 64페이지 | 50번 | 문제수정 | | 1981년 진해시 수돗물 불소농도조정사업에 사용되었던 불소는? |
| | | | 보기수정 | 3번 | 불화나트륨 |
| | 79페이지 | 23번 | 보기수정 | 1번 | III |
| 오답수정 | | | 1번 | 정답 : ② → ① | |

정오표

| 문제집 | 페이지 | 번호 | 수정항목 | 수정답안 | 수정내용 |
|-----|--------|-----|------|------|-------------------------------|
| 3권 | 78페이지 | 19번 | 보기수정 | 1번 | 후천성 얇 은 막 |
| | 170페이지 | 15번 | 보기수정 | | 나. 요철형 횡단면 치솔 |
| | 192페이지 | 7번 | 문제수정 | | 관골궁 의 구성을 올바르게 설명한 것은? |